


De
VRIENDEN van de PLANTENTUIN
GENT




driemaandelijks tijdschrift
vijfde jaargang
nr 4 december 1986

De VRIENDEN
van de
PLANTENTUIN
GENT

De
VRIENDEN van de PLANTENTUIN

GENT



driemaandelijks tijdschrift
vijfde jaargang
nr 4 december 1986

INHOUD:

60.000 PLANTEN ZIJN BEDREIGD	blz. 3
HERFSTTIJLOOS	7
BOUGAINVILLEA	9
CACTUSTUINTJES	13
SPEENKRUID	15
GROENE SNUFFELS	16
JAARVERSLAG 1986	19
LIDGELD 1987	23
ONZE MAANDELIJKSE RONDLEIDINGEN	24

een kerstgroet,
een nieuwjaarswens



luister aandachtig :
de weelde van de stilte bonst in de bomen

REDACTIE:

dhm. Prof. Dr. Van der Veken
De Permentier Christ
Clement Frans

Lenaerts Jan
Carton marcel
Plus Marcel

60.000

planten
zijn
bedreigd

Tegen het jaar 2050 kunnen één op vier plantesoorten, die op aarde groeien, uitgestorven zijn. Dit was de conclusie van de door de IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources) en WWF (World Wildlife Fund) samengebrachte plantenadviesgroep op haar tweede meeting in Las Palmas op 24-25 november 1985.

De werkgroep onder voorzitterschap van Dr. Peter Raven bestaat uit een klein team van leidende botanistenbijeën geroepen door het IUCN en het WWF om advies te geven over het Behoudsprogram voor Planten.

In vergelijking met de vroegere ramingen van bedreigde planten is het aantal dramatisch toegenomen.

Het was Ronald Melville die ca. 1970 de eerste ramingen maakte waarbij hij vooropstelde dat 20.000 soorten bedreigd waren. Hierbij dacht Melville wellicht aan planten onder directe bedreiging d.w.z. in de IUCN kategorieën "Bedreigd" en "Kwetsbaar". Zijn raming was opgemaakt voordat de bedreiging van veel tropische bossen en droge landschappen duidelijk merkbaar was.

Na bespreking was men akkoord dat 60.000 soorten bedreigd zijn, nadat Peter Raven het volgende argumenteerde :

"De theorie van de eiland-biogeografie stelt dat als een gebied herleid is tot 10% van zijn oorspronkelijke grootte, de helft van de plantesoorten verloren zijn. De natuurlijke vegetatie van Madagascar, van het laagland van het westen van Ecuador en van de Braziliaanse wouden langs de Atlantische zijde zijn reeds herleid tot minder dan 10% van hun oorspronkelijke grootte ten overstaan van 50 jaar geleden. Een voorzichtige raming geeft in elk van deze gebieden ca. 5.000 hogere plantensoorten en bij een voorzichtige extrapolatie rekent men op ca. 100.000 endemiën van allereerste microorganismen. Uit voorgaande cijfers heeft men berekend dat ten minste 7.500 plantesoorten en 150.000 diersoorten en microorganismen mogelijk reeds uitgestorven zijn of zich aan de uitstervingsgrens in deze gebieden bevinden.

De wouden van het West-Braziliaanse Amazonegebied en de binnenlanden van Guyana samen met het Zairebekken in Centraal Afrika zullen gebeurlijk het langst relatief ongestoord blijven.

Men kan echter berekenen dat alle andere tropische en subtropische wouden zullen vernietigd of ten minste verstoord worden gedurende de volgende dertig jaar. Tijdens deze periode zal de bevolking van Afrika, Latijns-Amerika en Zuid-Azië verdubbelen.

Zo zullen ca. 25.000 plantesoorten in de wouden van Zuid-Amerika en ca. 15.000 soorten in de gesloten wouden van Zaire het langst behouden blijven. Dus zullen slechts 40.000 soorten of ca. $\frac{1}{4}$ van alle plantesoorten die in de tropen groeien, na 2050 nog bestaan.

De bijkomende 130.000 plantesoorten nochtans die in de tropen voorkomen - maar niet in hoger vermelde gebieden - zouden in de volgende decennia volledig kunnen vernietigd worden.

Dit betekent dat ongeveer de helft van deze soorten kruidachtig zijn en leven in kleine vegetatiegebieden. Men moet bijgevolg tot het verschrikke-

lijk besluit komen dat meer dan 60.000 plantesoorten in de tropen en subtropen uitroeingsrisico's lopen tijdens ons leven en dat van onze kinderen. Een uitroeingsgebeurtenis van deze grootte is op onze aarde niet meer voorgekomen sedert het einde van de Krijtperiode ca. 65 miljoen jaar geleden.

Om deze situatie te verbeteren moeten we de bedreigde planten opsporen, leren kennen en ze eventueel snel verplaatsen om er zoveel mogelijk te redden, vooral met aandacht voor de soorten met bijzonder wetenschappelijk of economisch belang dat ze nu hebben of in de toekomst kunnen hebben.

Een meer gedetailleerde raming is de volgende stap. Namens de Planten-Advies-Groep is de commissie die zich bezighoudt met de bedreigde planten erop gebrand om een onderzoeksvoorstel te doen om de uitsterving land per land te voorkomen. Zij wil in voeling blijven met wetenschappers die in zulke projecten geïnteresseerd zijn.

Het getal 20.000 had een enorm impact omtrent de zorg voor onze natuur. Laat ons hopen dat het nieuwe getal, hoe verschrikkelijk en ontmoedigend dit ook is, toch een gelijkaardig effect mag hebben en mag leiden tot acties om deze vernietiging te bestrijden.



doorgede.



vracht beginsel.



doosvracht.

HERFSTTULOS
=

el.

Herfsttijloos

(COLCHICUM)

Herfsttijloos of *Colchicum autumnale* is een plant met grote, lilaroze bloemen.

Deze knolachtige plant is heel interessant.

In het voorjaar heeft ze drie bij elkaar geplaatste, tot 40 cm lange lancetvormige bladeren met, heel wonderlijk, daartussen weggedoken, een driedelige doosvrucht, die zo groot is als een noot.

In de loop van de zomer sterven de bladeren af, zodat tegen midden augustus de plant bloeit terwijl er geen blad te zien is.

Vanwege haar gelijkenis met de saffraan leverende krokus, kreeg de plant ook wel de naam wilde saffraan.

Uitgegraven knollen kunnen zonder aarde tot bloei worden gebracht, vandaar de naam droogbloeiër.

De Nederlandse naam herfsttijloos duidt op het verschijnsel dat de plant in augustus-september bloeit en pas in het daaropvolgende voorjaar rijpe zaden voortbrengt; ze blijkt dus niet aan het "normale" seizoen gebonden te zijn.

De met een bruin vlies omgeven knol van de herfsttijloos is gevoelig voor vorst en trekt zich tot aan de vorstgrens in de aarde terug.

De bloemen verschijnen uit een kleinere knol, die zich in de loop van de zomer naast de moederknol heeft gevormd.

De zes bloemdekblaadjes zijn gelijkmatig paarsroze of wit. Het onderste gedeelte van deze bloemdekblaadjes, de nagel, vormt een lange buis, waarin de draadvormige stampers staan. Zijn de bloemen bevrucht, dan groeien de eicellen niet eerder uit

dan na de winter. Het vruchtbeginsel blijft zolang onder de grond. Pas in het voorjaar groeit het naar boven en komt tussen de zich dan eveneens ontwikkelende bladeren te voorschijn. Het is een ingenieuze methode om de zich ontwikkelende zaden tegen vorst te beschermen.

De knol, zaden en in mindere mate de bladeren bevatten het sterk giftige alkaloïde colchicine (zie ook GIFTIGE PLANTEN VOOR MENS EN DIER, Nr 2 juni 1985).

Reeds in de 13e eeuw was bekend dat een tinctuur uit de zaden bereid, als geneesmiddel kon dienen tegen rheuma en jicht.

In de volksgeneeskunde maakte men een aftreksel van knol en bloemen, waarmee luizen en ander ongedierte bestreden werd.

Colchicine wordt ook gebruikt om nieuwe plantarassen te kweken, de zogenaamde tetraploïden, die over het algemeen uitmunten door groeikracht, rijke bloei, grote produktie en goede weerbestendigheid.

DE SIMPELAERE Brigitte.

Bougainvillea

De Bougainvillea is nog bij velen een onbekende en dus ook onbeminde plant. Het is een houtige plant die behoort tot de familie der Nyctaginaceae. Net zoals de Kerstster heeft ze haar sierwaarde te danken aan de kleurige bracteeën of schutbladeren. De bakermat van deze plant is Brazilië, waar ze werd ontdekt in de achttiende eeuw door admiraal de Bougainville; dit verklaart dan ook meteen haar naam.

In het warme klimaat rondom de Middellandse Zee kunnen de takken een lengte van wel zes meter of meer bereiken! In de kas zal de Bougainvillea daardoor een flinke ruimte ter beschikking moeten krijgen. Nochtans kan ze ook met succes op de vensterbank worden gekweekt in een kleine pot (12cm diameter). Het is een klimplant waarvan de takken voorzien zijn van korte doornen. De bloemen zijn eerder onbeduidend. Ze staan in groepjes van drie omgeven door drie schutbladeren. Elke bloem bevat 6 tot 7 meeldraden. Door de opkomst van de hybriden is er momenteel een heel kleurenscale beschikbaar. Zo heeft men planten met rode, roze, oranje, gele en witte schutbladeren; om dan nog niet te spreken van de verschillende tinten van de opgesomde kleuren! In dit artikel zal ik mij beperken tot de bespreking van de drie voornaamste soorten met enkele van hun cultuurvariëteiten. De bladeren van de Bougainvillea zijn ovaal of hartvormig en kunnen zowel blijvend als afvallend zijn.

BOUGAINVILLEA GLABRA bezit purperen schutbladeren. Het is een krachtig groeiende plant die al jong bloeit. Er bestaan meerdere cultivars van deze soort. De meest bekende zijn "Sanderiana" met paarsachtig rode schutbladeren en "Crimson Lake". Deze laatste cultuurvariëteit bezit karmijnrode

bracteeën en fijngetekende bladeren in de vorm van een hart. De bloemen (en de prachtige schutbladeren) verschijnen in het voorjaar en de voorzomer. BOUGAINVILLEA *SPECTABILIS* bloeit in de zomer. De bloemen zijn omgeven violetrode schutbladeren. De bloei is echter minder overvloedig dan deze van de vorige soort. De belangrijkste cultivars zijn "Lateritia" (karmijnrood) en "Lady Wilson" (kersrood).

Dan is er nog de hybride BOUGAINVILLEA x BUTTIANA "Killie Campbell" met oranje schutbladeren.

Om de planten binnen de perken te houden, worden ze getopt of langs stokken en ijzerdraad geleid. Volgroeide exemplaren vragen gedurende de lente en de zomer regelmatig water. Het is raadzaam éénmaal in de veertien dagen kamerplantenmest toe te dienen. Na de bloei zal men steeds minder dienen te gieten tot de potgrond in de winter bijna droog is. Tijdens deze rustperiode vraagt de plant een klare standplaats. De plant stelt zich in die periode tevreden met een temperatuur die schommelt tussen 6 en 10°. Pas als de groei in maart weer begint, mag men terug normaal beginnen gieten. De beste resultaten verkrijgt men wanneer de plant in lente en zomer in een warme en vooral zeer zonnige plaats vertoeft.

Februari is de maand waarin men de plant licht zal snoeien. De ingreep bestaat in het inkorten van de hoofdtakken met een derde. De zijscheuten snijdt men tot op 2½ cm van de hoofdtak weg.

Jaarlijks verpoten is eveneens noodzakelijk om de plant in een ideale conditie te houden; het beste tijdstip hiervoor is direct na de bloei.


Wie zijn Bougainvillea wil vermeerderen, kan dit doen door het nemen van zomerstekken. Hiervoor snijdt men met een scherp mes topstekken (8 tot 10 cm lang) van de mooiste bloemdragende takken. Deze stekken dienen na het afsnijden zo spoedig mogelijk in een mengsel van turf en zand (verhouding 3/1) worden gestopt. Hierna dekt men de stek-

ken af met plasticfolie om de luchtvochtigheid hoog te houden. Dit is nodig om de verdamping te remmen en also te voorkomen dat de stekken gaan verwelken. Nu komt het erop aan de stekken goed vochtig en warm te houden (rond de 22°). Eens de stekken zijn ingeworteld, mag men de plasticfolie verwijderen. In de handel zijn ook speciale stek- of zaaibakjes (naargelang het gebruik) voor de liefhebber verkrijgbaar. Bij aankoop van dergelijke bakjes moet men erop letten dat het deksel is voorzien van een ventilatie-opening. Hierdoor wordt een te grote condensatie, die verrotting kan teweegbrengen, vermeden. Om de beworteling te stimuleren, bestaan er "groeistoffen". Het zijn poeders die we in de handel o.a. aantreffen onder de namen "Rhizopon" en "Rootone". Alvorens de stekken in de stekgrond te steken, zal men ze eerst in het poeder doppen en lichtjes afkloppen. Bougainvillea's kunnen wel eens belaagd worden door luizen of trips. Trips zijn de gevleugelde insecten die we in de zomer soms met massa's kunnen waarnemen bij drukkend weder (de zgn. donderbeestjes). Samen met luizen zuigen ze sappen uit de plantedelen, waardoor de plant verzwakt. Dit kan zich uiten door vergeling van de bladeren, verminderde groei, We kunnen deze lastposten op een milieuvriendelijke wijze bestrijden met een extract van vlierbladeren. We nemen hiervoor 1½ kg gehakte vlierbladeren en laten die een half uur koken in 3½ liter water. Na afkoeling van het brouwsel lossen we vervolgens 30 g zeepvlokken of weke zeep op in 1 liter water en voegen dit toe aan het mengsel. Hierdoor wordt bij het bespuiten de vloeistof beter verdeeld over de plant. Tot slot nog even dit: wanneer bij het verschijnen van de bloemen de planten worden verplaatst van een lichte naar een minder lichte standplaats, zoals de woonkamer, kunnen de bloemknoppen en zelfs de bloemen gaan afriuen. Dit kan gepaard gaan met een sterke bladval! Vooral bij de aankoop van een

bloeiende plant, waarbij de planten rechtstreeks uit de serre komen, kan dit euvel voorkomen. Men kan dit verhelpen (indien mogelijk) door de planten 8 tot 10 dagen vóór de verandering van milieu te dompelen in een groeistofoplossing van 100 mg alfa-naftylazijnzuur (Rhizopon 8) per 10 liter water. Het middel kan ook over de plant worden verspoten.

Mits een goede verzorging kan je jarenlang van je Bougainvillea genieten en ik hoop alvast dat ik je met dit artikel heb overtuigd om er een in huis te halen.

Kurt BECUE.



BOUGAINVILLEA SPECTABILIS.

a. bloeiende twijg.

b. bloei met rood schutblad.

naar Hegi, Ill. Flora Mitteleuropa,
VII - 1931; blz. 51.

cactustuintjes

Cactussen worden meestal in ondiepe schalen van aardewerk geplant, heel dikwijls samen met een paar soorten vetplanten zoals de Haworthia.

De Haworthia's zijn kleine, rozetvormige planten die lijken op de Amerikaanse agavensoorten.

Sedum en Kalanchoë kunt U beter niet gebruiken daar deze tamelijk ver uitschieten en sprieterig worden.

Voor U gaat planten zorgt U voor een goede waterafvoer. Leg onderin de schaal een 3 cm dikke laag grind of scherven. Vul dan de schaal verder met een speciaal aardemengsel speciaal geschikt voor cactussen en vetplanten.

Kies voor kleine, langzaam groeiende plantjes.

Na het planten duwt U de aarde stevig aan en strooi er een laagje fijn zand of gekleurde steentjes over. Deze steentjes zijn in verschillende kleuren verkrijgbaar in praktisch iedere bloemenzaak. Ze zorgen ervoor dat wortelhals en stengels droog blijven en dus niet gaan rotten.

Daarna maakt U de schalen schoon.

Maak met een borsteltje zelf de planten schoon.

Geef iedere plant, afhankelijk van de grootte, 1 tot 2 eetlepels water, dit is echt voldoende.

Cactussen die tijdens het overplanten beschadigd zijn, mogen de eerste 3 tot 4 dagen geen water krijgen.


Wanneer U deze tuintjes éénmaal per maand water geeft is dat ruim voldoende.

Veel plezier ermee!!!

DE SIMPELARERE Brigitte.

SPEENKRUID.

- a. bloeiende plant.
b. basis kroonblaadje.
c. meeldraad.
d. stamper.
e. vrucht.
f. okselknolletjes.



naar S. Ross - Craig,
Drawings of British Plants I (1948) p.35

Speenkruid

(RANUNCULUS FICARIA)

Speenkruid behoort tot de Ranonkelfamilie.

Je herkent het onmiddellijk aan zijn kleur en aan de gele, stervormige bloempjes die zich scherp aftekenen tegen de felgroene, hartvormige blaadjes.

Het plantje groeit laag bij de grond en bezit een merkwaardige manier om zich te vermenigvuldigen. Uit wortelknolletjes, die voldoende reservevoedsel bezitten opdat het plantje gemakkelijk zou opschieten, ontwikkelt zich het speenkruid. Deze langwerpige knolletjes verschrompelen en verdwijnen volledig.

Het plantje heeft ondertussen bladeren gevormd en deze bereiden op hun beurt bouwstoffen om als reserve voor volgende lente in nieuwe knolletjes opgeslagen te worden.

Zoveel economie had je beslist niet verwacht van zo'n bescheiden plantje!

Zodra de duisternis valt of tijdens gure dagen, sluiten de bloempjes zich veilig. Kelk- en kroonblaadjes vouwen zich samen en bedekken de inwendige bloemdelen, die op die manier voortreffelijk tegen de koude beschut zijn.

Omdat het speenkruid vroeg in het voorjaar bloeit, bestaat het gevaar dat, in ongunstige weersomstandigheden en bij gebrek aan insekten, de bestuiving der bloempjes uitblijft. Zo komt het dat het speenkruid zich meestal door middel van de kleine knolletjes voortplant.

De tweede manier om zich voort te planten is het feit dat in de bladoksels eveneens kleine knolletjes met reservevoedsel groeien. Zodra de bloeitijd voorbij is vallen ze op de grond en uit deze broedknolletjes kan gedurende de volgende bloeitijd een nieuw plantje opschieten.

DE SIMPELAERE Brigitte.



Groene Snuffels

Kamerplanten zijn voor de meeste mensen een zeer welkom geschenk met de kerstdagen en eindejaarsfeesten.

Wil U er lang van genieten, plaatst deze planten dan nooit bij een warmtebron.

Bij de gewone verzorging vergeet ze echter nooit voldoende water en nu en dan wat voeding te geven.

Kamerplanten vragen tijdens de winter ook bescherming. Neem tijdens de nacht de planten van de vensterbank weg vooral als er dikke overgordijnen 's avonds en 's nachts dichtgetrokken worden.

Het vorstgevaar is niet denkbeeldig, maar ook zonder dat is het temperatuurverschil tussen dag en nacht te groot opdat de planten daar niet negatief zouden op reageren.

Direkt na de feestdagen is het gedaan met de grote belangstelling voor kerststerren. Natuurlijk staan ze voorlopig nog wel op de vensterbank, want ze kunnen bijzonder sterk zijn. Maar zij krijgen mededingers om hun plaats in te nemen. Lage primula's met hun kleurige bloemen lenen zich uitstekend voor een vleugje voorjaar in huis. Omdat zij niet zo duur zijn kan men best een drietal plantjes samen in een schaal bij elkaar zetten. Voor de estetika kiest U ze wel op kleur, bij voorbeeld in een witte pot drie roze of drie blauwe, dat staat mooier.

Ze hoeven ook niet in aarde te worden geplant. Veenmos bvb is prima, dat blijft immers lang vochtig en daar houden de primula's van. Zij verkiezen ook een koele plek. Na de bloei kunnen ze nog altijd in de tuin geplant worden voor volgend jaar.

Door hun vrolijke kleuren en gematigde prijzen, stelen ze eenieders hart.

Het is normaal dat kaktussen, die grotendeels uit woestijngebieden komen, van heel veel zonlicht houden. Plaats ze dus het liefst voor een raam op het zuiden of het westen. Alleen deze afkomstig uit de tropische regenwouden worden het best op het noorden of het oosten gericht. Het is dus van zeer groot belang te weten uit welke streek onze planten afkomstig zijn. Woestijnkaktussen plaatst men in de winter op een koele (5 à 10°) droge en niet verwarmde plaats.

Door te veel water in de winter gaan de kaktussen in het verkeerde seizoen groeien wat heel dikwijls misgroei tot gevolg heeft. Een ander gevaar van over-

vloedig gieten tijdens de rustperiode is dat de wortels gaan rotten waardoor de plant niet meer kan groeien en zal verschrompelen.

De tuinkas is ook een zeer geschikte winterverblijfplaats, maar let dan wel dat de temperatuur niet onder de 5° mag dalen.

Azalea's zijn planten welke de neiging hebben zeer gemakkelijk uit te drogen. Geef de potgrond liever een totale drenking dan herhaald te gieten. De uitgebloeide bloemen tot en met het vruchtbeginsel verwijderen, nooit droog laten komen en tijdens de zomer een openlucht-kuur in de tuin, zijn garantiepunten om volgend jaar weer te bloeien. Of zijn we akkoord met de wegwerpteelt?

Zolang de bodem van Uw tuin nog met de schop te bewerken blijft, kunnen er nog volop bloembollen worden geplant.

Lichte nachtvorst en plaatselijke sneeuw hebben weinig invloed op het planten van bloembollen, wel integendeel. Pas wanneer een aantal nachten het kwik fors beneden nul is gedaald en de grond onhandelbaar hard geworden is, stellen er zich problemen.

Verlies niet uit het oog dat in deze en de komende maanden aan de nog te velde staande gewassen door vorst en vogels schade kan ontstaan. Houd vooral bij sneeuwval alles goed in het oog. Sneeuw niet zo vlug verwijderen, het is een uitstekende isolatielaag voor de planten. Wel opletten voor Uw struiken dat de sneeuwlaag niet te zwaar wordt en de takken gaan afbreken.

JAAERVERSLAG

1986

Weer is een jaar voorbij en zijn al onze geplande activiteiten voor 1986 afgewerkt. Ik denk dat we er kunnen over akkoord gaan op een succesvol jaar te mogen terugblikken en dit op elk gebied.

Het ledenaantal groeide tot 642 inschrijvingen (vorig jaar 542), aantal dat schijnbaar wel een hoogtepunt bereikt, of niet? Mogen we twijfelen. Zijn de VRIENDEN nog tot meer in staat? Kunnen we er op rekenen dat ieder van U een nieuw lid aanbrengt!!!

Ook onze activiteiten waren een succes en zeer druk bezocht. Ziehier een korte opsomming met bijhorende kommentaar.

RONDLEIDINGEN

Er waren 26 maandelijkse rondleidingen met 835 deelnemers. Voor de 14 aangevraagde rondleidingen zowel binnen als buiten de Plantentuin, telden we 531 deelnemers, aantal dat minder was dan vorig jaar. Ook tijdens de Gentse Feesten was er minder bezoek, of zijn we te veeleisend. Met 1650 bezoekers waren we ver beneden het aantal van vorig jaar. Diverse redenen kunnen hier de oorzaak zijn. Dit jaar hadden we per dag slechts één rondleiding bij vorig jaar twee. Is er misschien verzadiging of is het omdat er 's namiddags meer activiteiten waren in stad?

De Open Deur Dagen van de Stad Gent op 13 en 14/9 brachten ons 165 bezoekers op.

Ook op de Paddestoelententoonstelling kon men

terug op onze gidsen rekenen.

Een dankwoord aan onze gidsen welke zich belangloos en met overgave van deze taak kweten.

TENTOONSTELLINGEN

Een nieuwigheid dit jaar was dat er, zelfs van buiten de stad, op onze medewerking aangedrongen werd. Deze was dan ook zeer op prijs gesteld en zeker opvallend.

EIGEN INRICHTING:

- 20 - 28/7 : 5 jaar Vrienden van de Plantentuin.
- 29 - 30/11 : Tijdens de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering:
5 Jaar Vrienden van de Plantentuin en
Creativiteit met droge natuurlijke materialen.

IN SAMENWERKING:

- 12 - 20/4 : Internationale Orchideeëntentoonstelling in de Plantentuin.
- 2 - 8/10 : Paddestoelententoonstelling samen met de R.U.G.
Bereiding van paddestoelenschotels.

OP UITNODIGING:

- 23 - 25/8 : Tijdens de Ajuinmarktfeesten te Ledeberg.
- 28/8 - 1/9 : Hobby Flora te Oudenaarde.
- 20 - 25/9 : Tuin- en Landbouwtentoonstelling te Aalst.
- 11 - 19/10 : Seniorama te Gent.

KURSUSSEN:

Onze Gilberte Comhaire overtrof zich dit jaar met de 2 reeds traditioneel geworden kursussen, Ikebana en Creativiteit met droge natuurlijke materialen.

We zijn haar dan ook zeer dankbaar. Niet alleen wij maar zeker ook de talrijk opgekomen kursisten

staan vol bewondering voor haar kunde en inzet.

3-10-24-30/5 : Ikebana.

15 en 16/11 : Creativiteit met droge natuurlijke materialen.

25/5 en 6/9 : Wandelingen als voorbereiding van de kursussen.

WANDELINGEN EN UITSTAPPEN:

We kenden weer een groot aantal deelnemers op de diverse uitstappen. We zijn niet alleen de deelnemers maar ook de taktvolle en bekwame gidsen zeer dankbaar.

1/5 : Leupegem ($\frac{1}{2}$ dag).

18/5 : Balegem ($\frac{1}{2}$ dag).

29/6 : Hoge Venen (1 dag).

17/8 : Citadelpark te Gent ($\frac{1}{2}$ dag).

27/9 : Arboretum van Tervuren (1 dag).

THEMATISCHE WANDELINGEN IN DE PLANTENTUIN:

1/6 : Het bos.

3/7 : Medicinale planten.

4 - 5/10 : Paddestoelen.

HET TIJDSCHRIFT:

Doordat het orchideeënummer zo uitgebreid was verschenen de nummers 1 en 2 samen in een dikke uitgave, 3 en 4 verschenen op normale dikte.

Voor de redactie was het werk een heel stukje eenvoudiger dan vroeger door de aankoop van de "Viewtext", aankoop met toestemming van de algemene jaarlijkse ledenvergadering van vorig jaar. Dank voor deze wijze beslissing. Ook het verzenden loopt een heel stukje vlotter. Wat we echter de leden zouden willen vragen is in geval adreswijzigingen het secretariaat hiervan tijdig op de hoogte te brengen.

Ons tijdschrift wordt meer en meer geapprecieerd en groeit uit tot een volwaardige uitgave. We zullen ons wel eens moeten bezinnen over de inhoud ttz. per uitgave een uitgediept onderwerp of meerdere onderwerpen behandelen, of misschien

beiden. Wat ook, we doen ons best om nog beter te verschijnen. Daarom verwachten we dan ook nog meer teksten van onze leden.
In 1987 zullen we weer trachten een zesmaandelijks kalender te laten verschijnen.

VOORDRACHTEN:

- | | | |
|-------|---|---|
| 3/6 | : | "Camelia" te Leuven door Plus M. |
| 13/12 | : | "Planten op het Lam Gods" door de heer Dierick A. |

VERGADERINGEN:

Verder waren er verschillende bestuursvergaderingen, voorbereidende bijeenkomsten voor onze en andere activiteiten, vergaderingen buiten de vereniging waarin we ook vertegenwoordigd zijn (Culturele Raad van Gent en het Vlaams Verbond voor Tuinbouwliefhoudersverenigingen).

Onze Algemene Jaarlijkse Ledenvergadering ging door op 29/11.

TEN SLOTTE:

We wensen iedereen te danken voor hun medewerking en zeker de mensen van het cafetaria die zich steeds belangloos inzetten en menig uurtje spenderen om deze opdracht tot een goed einde te brengen. We danken hun niet alleen voor de inzet, maar ook voor de duiten die ze in de kas brachten en ons alzo hielpen het hoofd boven water te houden. Dank aan iedereen. Uw entoesiasme is voor ons een riem onder het hart, een stimulans om verder te ijveren en nog beter trachten te doen.

De volgende Jaarlijkse ledenvergadering gaat door op 28/11/1987.

P.M.

Lidgeld 1987 !!

We danken de leden voor het hernieuwen van hun lidmaatschap in 1986 en voor het vertrouwen dat ze in ons stelden.

We danken de nieuwe leden voor hun aansluiting en heten ze van harte welkom. We hopen dat U meer dan Uw verwachtingen gevonden heeft.

We danken de algemene ledenvergadering van 29/11 die ons de toelating gaf het lidgeld op te trekken tot 250 fr. Het was een noodzakelijke beslissing. Het drukken en de verzendingskosten zijn in 1986 fel omhoog gegaan en het is dank zij de inzet en de arbeid van diverse leden dat we het jaar zonder schulden konden afsluiten.

We hopen dat deze lichte verhoging U niet zal afschrikken. Uw lidgeld te storten op onze rekening 001-1192154-03 met bijgesloten stortingsformulier. Buiten deze 250 fr kunt U ook 500 fr (beschermlid) of 1000 fr (erelid) storten of andere sommen. Alle giften zijn welkom!!!

Vele mensen zeggen ons dikwijls: We zijn met twee aangesloten maar we moeten slechts één tijdschrift ontvangen. Mogen we die mensen verzoeken 500 fr te storten voor één aansluiting. Administratief aanzien we elke storting als één aansluiting, U zult slechts één boekje ontvangen en zal zo Uw wens dan ook in vervulling gaan met dezelfde voordelen en rechten.

P.M.

onze maandelijkse rondleidingen

Hierin gaat er dit jaar grote verandering komen. Reeds dikwijls maakten de leden ons terecht opmerkzaam dat er slechts algemene rondleidingen waren de eerste zondag van de maand. Jaar in, jaar uit worden ze praktisch altijd langs dezelfde planten geleid. Voor bezoekers die slechts een paar maal komen is dit niet zo erg, maar voor hen die bijna altijd aanwezig zijn kan de belangstelling in dalende lijn gaan.

Daarom gaan we in 1987 het roer omsmijten.

De gidsen besloten elke maand een andere thematische wandeling te zullen inrichten.

Ziehier de kalender:

- 1/2 : Algemene rondleiding.
- 1/3 : De cactusserre.
- 5/4 : Bromelia- en varenserra en -sleuf.
- 3/5 : Het bos.
- 7/6 : Tropische voedingsgewassen.
- 5/7 : De medicinale planten.
- 2/8 : Planten uit de Bijbel.
- 4/10 : Paddestoelen.
- 1/11 : Algemene rondleiding.

Deze rondleidingen beginnen telkens om 9u30.

Voor de wandelingen van 3/5 en 5/7 zal er telkens, bij slecht weder en in vervanging, een algemene rondleiding gegeven worden in de serres.


De week van de Gentse feesten zal later besproken worden.

We hopen hiermede de leden op hun vraag tegemoet te komen, en de belangstelling aan te moedigen.

P.M.

De VRIENDEN
van de
PLANTENTUIN
GENT

De
VRIENDEN van de PLANTENTUIN
GENT



driemaandelijks tijdschrift
vijfde jaargang
nr 4 december 1986

verantwoordelijke uitgever:

M. PLUS
Driesstraat 35
9218 GENT-LEDEBERG
tel. 091-31 03 71